

BILAN SYLVO-SANITAIRE 2025



Une année contrastée, mais calme au niveau sanitaire.

Globalement favorable mais canicules, pathogènes, dépérissements, exotiques.

Variabilités climatiques : printemps sec au Nord, pluvieux ailleurs; année chaude, automne très pluvieux, pluie estivale arrivée au bon moment.

Pas d'événement nouveaux sur les essences : pas de fortes dégradations, de dommages atypiques.


On profite de 2024 !




Le réseau du DSF

280 Correspondants-Observateurs
7 pôles, 30 permanents

Climat



- L'été 2025 se situe au 3e rang des **étés les plus chauds** depuis 1900.
- Le cumul de précipitations de l'année 2025 est proche de la normale sur la quasi-totalité du territoire, malgré des **contrastes** saisonniers




Climat – Sécheresse et Canicule

Deux vagues de chaleurs 19 juin-4 juillet et 8-18-août (surtout moitié sud du pays).



Impactant pour les forêts
Attention ambiance forestière.


Dessèchements de
feuillage sur chêne sessile
(B. Mesnier, CO-DSF, ONF
Côte d'Or)




Brunissements de versants complets en petite
montagne jurassienne (N. Bourgoïn, CO-DSF, DDT)



Marcilloles(38)- 20 août 2025 M Migdal



Climat – Orage et grêle



Grêlons de 5 à 6 cm de Ø à Auch (32)
©Clément Ducasse



+ sphaeropsis sur les pins


Suite à la grêle 25 juin Gers -
Florent Nonon - CNPF

Suivi global de la santé




Suivi global : déficit foliaire

Feuillus




Résineux




Suivi global : mortalités

La mortalité annuelle s'élève en moyenne à 16,7 millions de m³/an sur la période 2015-2023, contre 7,4 Mm³/an sur 2005-2013, soit une hausse de 125 % en dix ans.



RSSDF


ÉVOLUTION DU VOLUME DE BOIS MORT SUR PIED DE MOINS DE CINQ ANS PAR CLASSE DE DIAMÈTRE



IGN


Suivi des plantations

Réussite inférieure à la moyenne
surtout dans le centre et l'ouest: 21 % de
plantations en échec (11% de plants morts)



Part importante de sécheresse, chaleur, mais
impact limité


Mortalités abiotiques





encore des problèmes de plantation

Suivi des plantations

Résineux



Feuillus




GE : 80 % des plantations ont un taux de reprise de 80 % et plus

Nom de la GRECO	nombre de plantations en 2025	Taux de reprise 2025	taux de reprise moyen 2007-2025
Grand Ouest cristallin et océanique	101	89,54	89,94
Centre-Nord semi-océanique	229	81,78	84,49
Grand Est semi-continental	215	85,15	82,95
Vosges	62	89,31	86,95
Jura	34	87,12	84,96
Sud-Ouest océanique	112	87,12	92,44
Massif central	234	85,53	88,47
Alpes	50	86,90	85,20
Pyrénées	15	92,13	92,51
Méditerranée	14	83,00	76,12
Corse	-	-	73,00

Les ESSENCES




8 % de l'ensemble des arbres qualifiés.




Évolution du taux de nouveaux arbres morts

2003-2010 2012-2019 2017-2024




CHENES : suivi global



- 83 : Centre-Ouest-Aquitaine
- 84 : Bourgogne-Franche-Comté
- 85 : Seine-Nord
- 86 : Grand-Est
- 87 : Midi-Méditerranée
- 88 : Auvergne-Rhône-Alpes

CHENES : suivi global

110 chênaies, 60 000 arbres



Globalement, une dégradation : 40 % de dégradés significativement, 8 % légèrement améliorés, 52 % relativement stables.

GE/(BFC) : mauvais été 2020, stabilité voire amélioration de certains massifs.

Ouest : plus grosse dégradation mais bon état ; dégradation marquée sud Centre Val de Loire (Châteauroux, Gâvre, Vibraye, Hunaudaie).


Domaniales de l'Allier : forêts les plus dégradées.

Occitanie : état moyen mais stabilité.

MAIS, chaque cas est unique (histoire, station, biotiques, crises passées...).

CHENES : défoliateurs

Une régressions sur les 3 dernières années




Processionnaire chêne – Bombyx ++

CHENES : punaise réticulée




Impact ?





CHENE : oïdium

Facteur
impliqué dans
les
dépérissements





Chêne pédonculé : suivi global

26 millions d'arbres altérés, parmi les 253 millions d'arbres qualifiés.
Taux d'arbres forestiers altérés en moyenne de **10 %**




Chêne sessile : suivi global

19 millions d'arbres altérés, parmi les **228 millions** d'arbres qualifiés. Le taux d'arbres forestiers altérés est donc en moyenne de **8 %**




HETRE

Stabilité



FRENE : chalarose



Reste impactante, toujours un sujet DSF, dépérissements s'accroissent.

Risque sécurité populations.

Progression : Pyrénées totalement contaminées.

Bretagne, tous les secteurs avec des frênes (forêts, haies et alignements) désormais touchés = extension complète de la maladie.


Pourtour méditerranéen et Corse indemnes.

ERABLE : suie

- Agent de dégradation et de mortalité.
- Emergence.
- Recherche (thèse),
Expérimentation sylviculture
(IRISS).




ig.15 Maladie des taches blanches de l'érable (Haute-Saône, G. Klein, CO-DSF, ONF), nécroses cambiales et dessèchements de pousses (Haute Saône, D. Jolissaint, CO-DSF, DDT)




EPICEA

Evolution des volumes PA et PN en Epicea commun France entière et dans les DT où il est le plus présent



EPICEA : typographie




2017

2019

2022

2025




Epidémique : Jura > 1000m (25% des épicéas/sapins), Ain, Haute-Savoie mais commence à se stabiliser.

Ailleurs : endémie pas tout a fait atteinte (attention sécheresse, canicule, chablis, volis)

Hausse dans les Vosges, mais petits foyers avec % assez faible d'arbres atteints.





Haut Jura



EPICEA : typographie

Surface des pessières et des sapinières scolytées, saines et d'état indéterminé dans les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté et les départements de l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie en octobre 2025

Il en reste !




DOUGLAS



Nécrose cambiale en cours d'apparition
sur tronc de douglas
(10% des arbres du peuplement)

Pour les mortalités existantes : associées aux stress hydrique, parasites secondaires (scolytes du sapin, armillaire, fomes) et aux nécroses (parfois discrètes).




Mortalités hétérogènes: **moins en GE** et BFC, mais plus dans le NO et Aura (rougissements brutaux, à taux faibles, avec nécroses) mais localisé, à taux faibles.

DOUGLAS : problèmes

Hylobe, le problème récurrent des plantations.

Contarinia très discret.



Denis PELLISSIER

Aura: encore du roughphy



Roughphy 2025




Gestion de la
végétation ++,
une fois passé la
sortie d'hiver

Anthony CUBAYNES



SAPIN : ça va mieux

Evolution des volumes PA et PN en Sapin pectiné France entière et dans les DT où il est le plus présent



Légende


- Produits accidentels désignés
- Produits normaux désignés
- Taux de produits accidentels
- Total produits désignés



Conditions plus favorable de 2024
Attention à l'été 2025 sur les conséquences 2026.


SAPIN : mortalités

Fiches avec mortalités



Nouvelle évaluation prévue en 2026 (43 massifs et 9000 arbres observés en 2021) :

Mortalités vraiment en baisse depuis 2024.
Un peu de dégât « vent » dans les Vosges, c'est tout.
Pratiquement plus de mortalités rapides causées par les scolytes.
Reste les profils de dépérissement au long court (vieux sapins dégradés des Vosges pas exemple).



Situation sanitaire du sapin AURA Volume		
	%	Volume concerné
Classe D	6,82	6 206 200,0
Mort ou très dépérissant	3,89	3 539 900,0
Somme	10,71	9 746 100,0

CEDRE

Plantations **GE préoccupantes** : chignon racinaire, racines qui remontent, qui restent dans le godet, déséquilibre racine/partie aérienne, plants penchés et armillaire, comme chez le pin maritime.

Bretagne : problème sur des stations mal adaptées (stations rocheuses) vs

BFC : plutôt un succès en reboisement de résineux scolytés.

Cèdre dépérissant ©M. Taudin (ONF)



PINS : maladie des bandes rouges

Année exceptionnelle.


Chaleur et humidité 2024 = infection généralisée.



*DOTHSEP sur aiguilles
anciennes en automne
(08)*




*J. BERTHOLON -
MBR : manque très
important d'aiguilles
anciennes (57)*



PINS sylvestre : vigilance

DEPARTEMENT DE LA SANTE DES FORETS

Déficit foliaire par année et essence - Réseau systématique de suivi des dommages forestiers



Deperis, degadre, chaleur, @F. Dumortier





Et localement: : forêt de Chaux, massif de la Serre...

Haute-Loire, toujours, @Norbert RIOCREUX



PINS : processionnaire

Processionnaire du pin : expansion (front est, rapide dans l'Aisne, massif central, sur Ardennes touché) mais intensité faible.





MERCI DE VOTRE ATTENTION



romaric.pierrel@agriculture.gouv.fr)

Toute l'actualité de la santé des forêts :

Niveau national : <https://agriculture.gouv.fr/actualite-en-sante-des-forets>

Niveau Pôle Santé des forêts du Grand Est : <https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/Sante-des-forets>

